

BESPLATAN APIGUARD ZA PČELARE

Kao i prethodne dve godine, **Fond za razvoj poljoprivrede opštine Aleksinac** pomaže organizovanim pčelarima, članovima Društva pčelara Aleksinac koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Aleksinac, tako što im kupuje lek za suzbijanje varoe Apiguard, ove godine za 56,5% pčelinjih društava. Nedostajuće količine pčelari mogu da naruče pouzecom na telefon 011/344-6757 po ceni od 215 dinara za jednu kutiju (po košnici su neophodne dve kutije).

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Prva kutija Apiguarda se stavlja u košnice najkasnije 15. jula. Kašnjenja u davanju ne sme biti, ili će štete od varoe biti vidljive. Razlog leži u činjenici da je Apiguardu od stavljanja prve kutije do uklanjanja glavnine varoe iz košnice potrebno 30 dana delovanja. Nikako ne treba podleći iskušenju da se upotrebi samo jedna kutija, jer ona obara svega 30-40% varoa. Pun efekat se postiže isključivo **sa** dve kutije.

Apigard je zapravo timol u gelu. Pakuje se u tanke aluminijumske kutije, koje neodoljivo podsećaju na paštetu. Svaka kutija sadrži 50 g gela, a za jednu košnicu potrebne su dve kutije. Gel ima specijalne osobine da na visokim temperaturama sužava svoje pore, te timol isparava manje, dok na niskim širi svoje pore, te timol isparava više. Najbolje ga je dati do 15. jula, osim ako je u toku intenzivna paša, a još bolje ako je završeno poslednje vrcanje. Inače, karenca mu je 0 dana, što nema nijedan drugi lek za varou. Stavlja se jedna kutija na satonoše iznad plodišnog tela.

Košnica se svede na zimsku veličinu (kod DB košnice - najviše plodište i jedan polunastavak; kod LR košnice - najviše dva LR tela; kod Fararove košnice - najviše 3 Fararova tela).

Svi otvori na košnici se zatvore, ostavlja se samo standardno leto (recimo petnaestak centimetara širine i 7–8 milimetara visine). Iznad paštete Apigarda sa koje se skine folija (koja se takođe ostavlja u košnici pošto i na njoj ostane izvesna količina gela) mora se obezbediti najmanje 1 cm slobodnog prostora da bi pčele dolazile do gela (to se može ostvariti dodavanjem praznog nastavka, okretanjem Milerove hranilice naopako, stavljanjem bežalice i slično, a najbolje je umetnuti paštetu ispod gornjeg nastavka sa zalihom zimnice, a na satonoše donjeg, plodišnog nastavka, što je najpraktičnije kod Fararove košnice, a može se primeniti i kod DB košnice sa polunastavkom). Jer, timol ovde deluje kako putem isparavanja, tako i kontaktno, dok pčele nose čestice gela košnicom. Pašteta ostaje u košnici 2–2,5 nedelje. Nakon toga, otvara se košnica. Ako gela više nema u kutiji, ona se vadi i dodaje druga. A ako ga ima, samo se dodaje druga uz prvu. I time je tretman završen. Oko 5-6 nedelja nakon početka tretmana, više od 90% varoe biće ubijeno i možete ih prebrojati u fioci mrežaste podnjače (ako ih ne odnesu mravi, uholaže i drugi insekti).

Dok timol u preparatima (uglavnom amaterskim) gde nije rešena kontrola isparavanja, ne sme da se aplikuje na visokim temperaturama, dotle Apigard ima dobre rezultate samo kad se daje na visokim temperaturama. Preporučljivo je da srednja dnevna temperatura tokom perioda tretmana ne pada ispod 25 °C. Primena Apigarda u našoj zemlji je najopravdanija upravo u drugoj polovini jula i avgustu, što je vreme kada su temperature i onako uvek dovoljno visoke. Nikad nemojte davati Apigard tokom hladnog vremena, jer nećete dobiti željene rezultate.

P.S. Na priloženoj tabeli možete videti koliko kutija Apiguarda vam pripada, i koliko meda treba da donesete prilikom preuzimanja kutija. Med će biti doniran Fondu za razvoj poljoprivrede, a on će ga dalje plasirati u humanitarne i marketinške svrhe.